



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
Edital 044/2011

Cargo: Médico / Área: Cirurgia Geral

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará sua desclassificação.

CARGO: MÉDICO-ÁREA CIRURGIA GERAL - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES

1ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém proposição de ordem numérica das frases que se seguem, em consonância com a organização adequada de texto. O título se intitula “A questão da pobreza”.

() As evidências históricas mostram que a cultura humana esteve sempre intimamente ligada, desde os seus primórdios, à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais.

() Mesmo nas sociedades mais homogêneas e simples existiam diferenças de sexo e idade atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres.

() A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a certas vantagens como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade.

() Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual os homens desfrutassem de maneira semelhante os bens e as oportunidades da vida social?

() Parece que não.

() O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade.

“A questão da pobreza”. In: COSTA, Cristina. *Sociologia: introdução à ciência da sociedade*. 2ªed. São Paulo: Moderna, 1997. p. 254.

- A) 3, 6, 4, 5, 2, 1
- B) 2, 1, 3, 6, 4, 5
- C) 1, 2, 4, 5, 6, 3
- D) 4, 5, 1, 2, 3, 6
- E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

2ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém pensamento destoante do texto “A questão da pobreza”, organizado na questão anterior.

A) O processo histórico tem revelado como tendência do ser humano demarcar diferenciação crescente e de complexidade em sua organização social.

B) É nesse sentido que se evidencia, na organização social vigente, que a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e de injustiça com outros.

C) Os diversos grupos sociais, neste cenário de sociedade contemporânea, procuram monopolizar privilégios e possibilidades de acesso à produção de bens e aos mecanismos de distribuição dessa produção.

D) Encontrado o princípio de que todos possuem os mesmos direitos perante a lei, tem sido mais fácil justificar as diferenças sociais e articular ações no sentido de que todos sejam iguais na sociedade de hoje.

E) No curso das sociedades plurais, foram se formando grupos, cada um com suas funções, com seus direitos, deveres, compromissos e obrigações.

3ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de referência entre forma verbal e forma substantiva. Marque-a.

- A) infringência – infringir
- B) delinquência – delinquir
- C) ingerência - ingerir
- D) vigência - vigir
- E) emergência – emergir.

4ª QUESTÃO - Uma das alternativas NÃO contém correspondência entre os termos assinalados. Marque-a

- a) Afora ele, não ouvia ninguém. Fora ele, não ouvia ninguém.
- b) A pouco e pouco, deixou-se convencer. Pouco a pouco, deixou-se convencer.
- c) Cada vez mais, desconfia dos conselhos. De mais a mais, desconfia dos conselhos.
- d) Vez por outra, discute com a família. Por vezes, discute com a família.
- e) Em vez de decidir logo, prefere esperar. Em lugar de decidir logo, prefere esperar.

5ª QUESTÃO - Uma das alternativas completa corretamente a lacuna em “É de uso normativo dizer uma ou outra frase: _____.” Marque-a.

- A) Tenho dificuldade de saber o em que pensar. Sei no que pensar.
- B) Venho aqui hoje para esclarecer dúvidas. Não foi eu que fiz os registros em destaque.
- C) O relógio da praça bateu meio-dia e meia. No relógio da praça, bateu 12h30min.
- D) Não nos vemos faz muitos anos. Não nos vemos devem fazer muitos anos.
- E) Algum de vocês concordam com fazer a tarefa? Quais discordam de cumprir a tarefa?

6ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de forma plural. Marque-a.

- A) abdômen – abdomens ou abdômenes
- B) cânon – cânons ou cânones
- C) espécimen – espécimens ou espécímenes
- D) gérmen – germens ou gérmenes
- E) hífen – hifens ou hífenes.

7ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro e, portanto, NÃO completa corretamente a frase “O servidor público foi hospitalizado com _____.” Marque-a.

- A) fratura do fêmur ou femoral
- B) dor no tórax ou dor torácica
- C) distensão na virilha ou distensão inguinal
- D) corte no supercílio ou superciliar
- E) pressão da artéria ou pressão arterial.

8ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém frase correta. Marque-a.

- A) Os filhos são tais qual o pai.
- B) Que sonhos são mais ruins do que os dos indecisos?
- C) Os bombeiros ficaram alertas com as fortes chuvas.
- D) Durante as núpcias, os cônjuges se comportaram com discrição.
- E) Todas as crianças lactantes precisam tomar vacina contra a paralisia infantil?

9ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém uso de frase INCORRETAMENTE caracterizado. Marque-a.

- A) João foi fazer uma visita a seu amigo e depois saiu com a noiva dele. – uso inadequado de termos que se substituem
- B) Opiniões contraditórias, de forma geral, vão ao encontro dos princípios de umas e de outras. – uso adequado de palavras estreitamente relacionadas
- C) Me empreste o relatório em que estão os dados estatísticos sobre reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. – uso adequado de pronome em situação informal de fala
- D) Foram encontrados dois projetis pelos policiais. Dois projéteis foram localizados pela polícia. – uso adequado de palavras sinônimas
- E) Depois da festa de formatura, familiares, professores e concluintes saíram para tomar um trago na esquina. – uso inadequado de expressão trivial.

10ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro na indicação do valor do conector sublinhado. Marque-a.

- A) Como não há um partido dominante no país, a presidente tem necessidade de promover acordos estratégicos entre os partidos políticos (**causa**).
- B) A presidente não pode evitar a fragmentação da base parlamentar, sem que haja uma aliança política em torno de um programa de governo (**modo**).
- C) Por mais que a presidente tente atender aos interesses da base aliada, a necessidade de ter uma base sólida é testada à exaustão (**concessão**).
- D) O chamado “fogo amigo” assombra a presidente, pois os partidos aliados podem “sabotar” uns aos outros quando uma crise surge (**explicação**).
- E) A base aliada do governo é fisiológica demais, para que a presidente rompa com a prática de trocar votos por cargos e emendas (**consequência**).

(Frases adaptadas de “O perigo que mora ao lado”, *A Gazeta*, 12 agosto de 2011)

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO - Pedro comprou um fogão, cujo preço à vista é 420 reais, pagando em duas prestações mensais iguais. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e a taxa mensal de juros compostos praticada foi de 10%. O valor, em reais, de cada uma das prestações foi igual a

- A) 236,00
B) 238,00
C) 240,00
D) 242,00
E) 244,00

12ª QUESTÃO - Um recipiente tem 40 litros de limonada, composta de concentrado de limão e água, sendo que a água representa 20% da limonada. Deseja-se substituir certo volume da limonada por igual volume de água, de modo que a nova limonada tenha 30% de água. O volume, em litros, que deve ser substituído é

- A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
E) 5

13ª QUESTÃO - Um casal deseja ter 5 filhos. A probabilidade de que tenham 3 filhos de um sexo e 2 filhos do outro é

- A) 62,5%
B) 65%
C) 67,5%
D) 70%
E) 72,5%

14ª QUESTÃO - Em um condomínio de apartamentos,

- Nenhum praticante de futebol é praticante de voleibol;
- Todo praticante de basquetebol é praticante de futebol;
- Algum praticante de handebol é praticante de basquetebol.

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira.

- A) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol é praticante de handebol.
B) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol não é praticante de handebol.
C) Pode-se garantir que algum praticante de futebol não é praticante de handebol.
D) Pode-se garantir que todo praticante de basquetebol é praticante de voleibol.
E) Pode-se garantir que algum praticante de handebol não é praticante de voleibol.

15ª QUESTÃO - Uma agência de turismo alugou um ônibus de 48 lugares para passageiros. Ela cobrou de cada passageiro 600 reais acrescidos de 20 reais para cada lugar vago. Se o total de passageiros foi no máximo 40 e o total arrecadado de todos os passageiros foi 30340 reais, o total de passageiros foi

- A) 31
- B) 33
- C) 35
- D) 37
- E) 39

16ª QUESTÃO - Em um grupo de pessoas, o total de mulheres é igual a 10% do total de pessoas. A média aritmética das idades das pessoas do grupo é 45. A média aritmética das idades dos homens do grupo é 47. A média aritmética das idades das mulheres do grupo é

- A) 23
- B) 25
- C) 27
- D) 29
- E) 31

17ª QUESTÃO - Um pintor precisava pintar um muro inteiro. Com um ajudante, ambos juntos poderiam fazer a pintura toda em 6 horas. O pintor iniciou a pintura sozinho. Depois de 6 horas, o ajudante juntou-se a ele na pintura e, assim, depois de 10 horas contadas a partir do início da pintura, o muro estava todo pintado. O tempo, em horas, que o pintor levaria para pintar sozinho o muro todo é

- A) 17,5
- B) 18
- C) 18,5
- D) 19
- E) 19,5

18ª QUESTÃO - Um reservatório continha um volume inicial de água às 4 horas de certo dia. A partir desse instante, passou-se a retirar água do reservatório à razão de 3 litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água no reservatório era 20% do volume inicial de água. O horário daquele dia em que o volume de água no reservatório era 5% do volume inicial de água era

- A) 17 horas e 45 minutos
- B) 18 horas e 15 minutos
- C) 18 horas e 45 minutos
- D) 19 horas e 15 minutos
- E) 19 horas e 45 minutos

19ª QUESTÃO - Sejam x_1, x_2, \dots, x_n valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. O *desvio* de cada um dos valores x_1, x_2, \dots, x_n é a diferença entre o valor e a média aritmética dos valores. O *desvio padrão* dos valores x_1, x_2, \dots, x_n é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos seus desvios. Se o desvio padrão de x_1, x_2, \dots, x_n é d , com $d \neq 0$, então o desvio padrão dos valores $6x_1 + 7, 6x_2 + 7, \dots, 6x_n + 7$ é igual a

- A) d
- B) $6d - 7$
- C) $6d$
- D) $6d + 7$
- E) $d + 7$

20ª QUESTÃO - Num grupo de pessoas,

- 5 pessoas não são leitoras de nenhum dos jornais A, B e C;
- 25 pessoas são leitoras do jornal A;
- 32 pessoas são leitoras do jornal B;
- 11 pessoas são leitoras do jornal C;
- 4 pessoas são leitoras dos jornais A e B;
- 6 pessoas são leitoras dos jornais A e C;
- 7 pessoas são leitoras dos jornais B e C;
- 3 pessoas são leitoras dos jornais A, B e C.

O total de pessoas no grupo é

- A) 59
- B) 61
- C) 63
- D) 65
- E) 67

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão para as versões em Português.

21ª QUESTÃO – Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E	F
1	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
2	Fulano	6,0	8,0	7,0		7,0
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0


Na linha 1, o texto é mostrado em duas linhas e na célula selecionada a linha única de texto está mostrada na parte superior da célula. Para se conseguir isto,

- A) não é necessário fazer nada, pois é a configuração padrão.
- B) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova pressionando-se a tecla Enter
- C) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova, pressionando-se simultaneamente as teclas Enter e Ctrl
- D) é necessário selecionar a opção *Células* do menu *Formatar* e na janela que surgir, selecionar a aba *Alinhamento* e então ativar a opção *Quebrar Texto Automaticamente* e selecionar a opção *Superior para o Vertical*.
- E) é necessário clicar o botão direito do mouse sobre a célula. No menu que surgir, selecionar a opção *Quebrar Texto Automaticamente*. Repetir o processo para selecionar a opção *Alinhar acima*.

22ª QUESTÃO – Na parte inferior da janela do Excel, aparecem as abas que indicam as planilhas, como mostrado abaixo.



Deseja-se mudar o nome de uma planilha como mostrado abaixo.



Analise as ações:

- 1) Clicar duas vezes na aba e então digitar o nome desejado.
- 2) Clicar duas vezes na aba e na janela que surgir, digitar o nome desejado.
- 3) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção *Renomear* no menu que surgir, e então digitar o nome desejado.
- 4) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção *Propriedades* no menu que surgir. Na janela que surgir, digitar o nome desejado no campo Nome.
- 5) Selecionar a opção *Renomear planilha...* do menu Editar e então digitar o nome desejado.

Qual é a opção CORRETA?

- A) Todas as ações levam à mudança de nome.
- B) Apenas a ação 1 funciona.
- C) Apenas as ações 1 e 3 funcionam.
- D) Apenas as ações 1,3 e 5 funciona.
- E) Nenhuma das ações funciona, pois os nomes são fixos.

23ª QUESTÃO – Em um documento Excel foi criada uma planilha com uma tabela de juros em função do numero de parcelas mensais como mostrado a seguir.

	A	B
1	meses	juros
2	0	0
3	3	2
4	6	4
5		

Em outra planilha, deseja-se mostrar os juros a serem cobrados de acordo com o número de parcelas.

	A	B	C
1	Valor	Parcelas	Juros
2	R\$ 1.000,00	2	0
3	R\$ 1.500,00	5	2

Qual fórmula deve ser inserida na célula selecionada (e que pode ser copiada para as células abaixo) para mostrar os juros a serem cobrados?

- A) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;2)
- B) =PROC(B2;Tabela!A\$2:B\$4)
- C) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;1)
- D) =PROCV(B2;Tabela;1)
- E) =PROC(B2; Tabela!A2:B4;1)

24ª QUESTÃO – Em muitos textos, principalmente relativos à Matemática, é necessário o uso repetido de sobrescrito e subscrito. A configuração padrão do Word não tem esses ícones na barra de ferramentas como mostrado abaixo.



Pode-se fazer o Word mostrar ícones para sobrescrito e subscrito nessa barra como mostrado abaixo.



Como fazer com que, esses ícones apareçam, nesta posição, nessa barra de ferramentas?

- A) Clicar duas vezes sobre a barra de ferramentas e na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- B) Selecionar a opção Barra de Ferramentas do menu Exibir e selecionar a barra Formatação. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- C) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- D) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, clicar sobre Reorganizar comandos..., selecionar então a barra de ferramentas Formatação, adicionar os ícones e movê-los para a posição desejada.
- E) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito. Depois clicar com o botão direito sobre os ícones e movê-los para a posição desejada.

25ª QUESTÃO – Deseja-se fazer uma planilha Excel que calcule a média parcial e a média final dos alunos de uma turma como mostrado abaixo.

	A	B	C	D	E	F
	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
1						
2	Fulano	4,0	7,0	5,5	6,0	5,8
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Deve ser observado que a ausência de uma nota equivale a uma nota zero. Qual fórmula deve ser usada na célula selecionada?

- A) =MÉDIA(B2:C2)
- B) =SOMA(B2:C2)/CONTAR(B2:C2)
- C) =MÉDIAA(B2:C2)
- D) =SOMA(B2:C2)/CONTAR.NÚM(B2:C2)
- E) =SOMA(B2:C2)/COLS(B2:C2)

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

26ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

- I. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
- II. O prazo de validade de concurso público será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- III. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis, após 02 anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) I, II e III são falsas.

27ª QUESTÃO – Não são formas de provimento de cargo público:

- A) transferência e ascensão.
- B) nomeação e promoção.
- C) reversão e readaptação.
- D) reversão e recondução.
- E) reintegração e aproveitamento.

28ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

- I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- II. Reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
- III. Reintegração é o retorno por força de decisão judicial do servidor público ao cargo do qual fora exonerado, ensejando o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) Apenas III é verdadeira.

29ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- B) A gratificação natalina é excluída do teto de remuneração.
- C) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
- D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
- E) O servidor poderá perceber remuneração inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a Lei 8.112/90, dependendo da natureza do cargo ocupado e do regime diário de trabalho.

30ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o processo disciplinar regulado pela Lei nº. 8.112/90.

- A) As reuniões e as audiências das comissões de processo administrativo terão caráter reservado.
- B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
- C) A sindicância é a fase do processo disciplinar que antecede ao julgamento e que compreende a instrução, a defesa e o relatório.
- D) A autoridade competente somente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal.
- E) Transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição serão assegurados, ainda que na condição de denunciado ou indiciado.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES

31ª QUESTÃO – O nível de evidência científica dos estudos classificados como “caso-controle” é considerado

- A) Grau de recomendação A.
- B) Nível de evidência 1A.
- C) Nível de evidência 2C.
- D) Nível de evidência 3B.
- E) Nível de evidência 4.

32ª QUESTÃO – Referente ao Sistema Brasileiro de Transplantes e ao processo de doação de órgãos para transplantes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A morte encefálica é definida como a parada total e irreversível da atividade do tronco e hemisférios cerebrais, respeitando-se a resolução nº 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina, sendo necessários dois exames clínico-neurológicos e um exame gráfico complementar.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo de todo o processo de doação e transplante e provavelmente aquele que traz maior impacto no número final de doadores de órgãos, uma vez que o baixo número de notificações é a principal causa da limitada taxa de doadores e de transplantes, no nosso país.
- C) Em 1997, com a lei nº 9.434, foi criado o Sistema Nacional de Transplante, e utilizado o consentimento presumido, no qual o cidadão contrário à doação necessitava registrar sua decisão em vida.
- D) Tumores do sistema nervoso central, como o glioblastoma multiforme, não são mais considerados como contraindicação para a doação de múltiplos órgãos e tecidos para transplantes.
- E) As contra-indicações absolutas são de responsabilidade do coordenador hospitalar ou da OPO ou CNCDO, enquanto que a decisão sobre a utilização de determinado órgão ou tecido pertence à equipe de transplante.

33ª QUESTÃO – Dentre as operações listadas abaixo, assinale a intervenção considerada experimental pelo Conselho Federal de Medicina.

- A) Bypass jejunoileal
- B) Interposição ileal
- C) Gastroplastia vertical de Mason
- D) Gastrectomia vertical
- E) Gastroplastia com derivação intestinal

34ª QUESTÃO – A operação bariátrica, gastrectomia vertical deve ser considerada como opção terapêutica para tratamento da obesidade

- A) somente em protocolos de pesquisa clínica fase II.
- B) em doentes com contra-indicação ao procedimento padrão-ouro.
- C) nos doentes portadores de doença do refluxo gastro-esofágico.
- D) nas conversões de banda gástrica devido mau resultado restritivo.
- E) como benefício estético, nas operações por incisão única ou acessos naturais.

35ª QUESTÃO – FKL, homem, 48 anos de idade, proveniente de zona rural da região sul da Bahia, portador de esquistosomose na forma hepatoesplênica, com 03 episódios de hemorragia digestiva alta (hematêmese) no último ano, por duas vezes tendo sido necessário receber hemotransfusões. Atualmente, não sangra há 30 dias. A melhor conduta para o caso em questão é

- A) tratamento farmacológico e endoscópico.
- B) TIPS.
- C) desconexão ázigo-portal + esplenectomia.
- D) shunt esplenorrenal proximal.
- E) shunt esplenorrenal distal.

36ª QUESTÃO – TGB 56 anos, previamente diabética tipo 2 e hipertensa, submetida à gastroplastia vertical com reconstrução em Y-de-Roux há 07 anos. Atualmente, não manifesta mais diabetes mellitus ou hipertensão arterial. Entretanto, há 03 anos não realiza qualquer reposição de vitaminas ou exames de controle. Quadro clínico de astenia e parestesia em membros inferiores. Descorada +/4. Exames bioquímicos evidenciam: hemoglobina = 8,5 g/dL; paratormônio = 188 pg/ml; cálcio sérico normal; vitamina B12 = 85 pg/ml. A conduta mais apropriada seria a

- A) prescrição de suplemento de ferro por via oral + cálcio e vitamina B12 por via parenteral.
- B) prescrição de ferro por via parenteral + suplemento de cálcio por via oral + vitamina B12 parenteral.
- C) prescrição de ferro por via oral + suplemento de cálcio + vitamina B12 por via oral.
- D) reintrodução do polivitamínico padrão para uso contínuo e encaminhar para a nutricionista.
- E) transfusão de 02 concentrados de hemácias e reintrodução do complexo vitamínico oral padrão.

37ª QUESTÃO – Os portadores de carcinoma hepatocelular de 2,0 cm de diâmetro, localizados em segmento VI, em fígado não cirrótico, tem como opção mais apropriada de tratamento:

- A) segmentectomia hepática com margem de, pelo menos, 1,0 cm.
- B) hepatectomia direita com margem de, pelo menos, 3,0 cm.
- C) ressecção do segmento lateral esquerdo do fígado, com linfadenectomia regional.
- D) ressecção do segmento anterior direito do fígado, sem linfadenectomia regional.
- E) transplante hepático.

38ª QUESTÃO – Operações de grande porte, como a gastrectomia total radical ampliada, tem impacto grande sobre o estado nutricional do doente oncológico. No intuito de minimizar esses efeitos nutricionais deletérios das intervenções deste tipo,

- A) deve ser indicada nutrição parenteral precoce no período pré-operatório desses doentes.
- B) deve ser realizada confecção sistemática de jejunostomia para alimentação pós-operatória precoce.
- C) deve ser instalada sonda nasoentérica, em posição jejunal após a anastomose da base do “Y-de-Roux”, para alimentação precoce.
- D) deve ser iniciada nutrição parenteral no intra-operatório e estendida, pelo menos, até o 10º dia de pós-operatório.
- E) deve ser liberada dieta líquida + suplementos hiperproteicos pela via oral assim que o doente apresentar ruídos hidroaéreos, para minimizar os efeitos deletérios do jejum.

39ª QUESTÃO – PBE, 51 anos, icterico, com diagnóstico de neoplasia pancreática de 3,5 cm em porção cefálica justaduodenal, com 02 metástases hepáticas. O estudo anatomopatológico, obtido por meio de biópsia guiada por ecoendoscopia, evidenciou tratar-se de adenocarcinoma ductal moderadamente diferenciado. Índice de performance de Karnofsky = 90. A conduta operatória mais apropriada é a

- A) gastroduodenopancreatectomia cefálica e quimioterapia complementar.
- B) gastroduodenopancreatectomia cefálica e ressecção das metástases hepáticas.
- C) gastroduodenopancreatectomia cefálica, ressecção das metástases hepáticas e linfadenectomia regional.
- D) anastomose biliodigestiva + quimioterapia complementar.
- E) anastomose biliodigestiva + gastroenteroanastomose + alcoolização do plexo celíaco.

40ª QUESTÃO – O divertículo faringoesofágico, também conhecido como divertículo de Zenker,

- A) é um divertículo de tração, relacionado com a hipertonia do músculo cricofaríngeo.
- B) tem como tratamento operatório de eleição a diverticulectomia com miotomia do músculo cricofaríngeo.
- C) não tem relação com o surgimento do carcinoma esofágico.
- D) trata-se da principal causa de disfagia em mulheres jovens.
- E) Localiza-se no triângulo de Killian, que tem como limites o músculo cricofaríngeo e os constritores laterais da faringe.

41ª QUESTÃO – As infecções de sítio cirúrgico são mais frequentemente causadas pela microbiota do próprio doente. Entretanto, durante o período de 2003 a 2010, o Brasil vivenciou em dezenas de estados diversos surtos de infecções em sítio cirúrgico de operações realizadas por videocirurgia causadas por micobactérias de crescimento rápido. Dentro desse contexto é CORRETO afirmar que

- A) as evidências de resistência da *M. massiliense* ao glutaraldeído em tempos de exposição de até 10 horas, indicam que esse mecanismo pode ter tido papel decisivo na propagação dos surtos.
- B) os surtos não tiveram relação entre si, pois, apesar de em quase todos os casos tratar-se de um mesmo clone de bactérias, o país é enorme e não há como relacionar casos do Pará com casos do Rio Grande do Sul.
- C) a autoclavagem dos materiais garante a não sobrevivência da *M. massiliense* e a ausência de risco de infecção operatória.
- D) o tratamento antimicrobiano da *M. massiliense* com Etambutol associado à Terizidona mostrou-se muito efetivo.
- E) a transmissão interpessoal pela não lavagem de mãos e não uso de máscaras propiciou a disseminação do surto.

42ª QUESTÃO – Operações bariátricas e metabólicas em indivíduos portadores de diabetes mellitus do tipo 2 (DMT2) tem contribuído para controle, remissão e cura dessa doença metabólica relacionada à obesidade. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao tratamento cirúrgico do DMT2.

- A) As operações mistas têm obtido maiores índices de cura, em relação às operações puramente restritivas.
- B) A banda gástrica ajustável é o método com menor mortalidade em curto prazo, em relação às operações mistas.
- C) Operações bariátricas e metabólicas podem ser consideradas em indivíduos portadores de DMT2, com índice de massa corporal entre 30 e 35, desde que o tratamento clínico não esteja sendo eficaz.
- D) A produção incretínica, após operações bariátricas e metabólicas, fica elevada, sendo comum o surgimento de nesidioblastose no período pós-operatório.
- E) O tempo de doença, nas operações para tratamento do DMT2, é fator prognóstico importante. Sendo a probabilidade de remissão ou cura inversamente proporcional ao tempo de duração da doença.

43ª QUESTÃO – GTA, 35 anos, mulher, submetida à colecistectomia por videocirurgia, devido à colelitíase. Durante o ato operatório, foi observada lesão acidental da via biliar principal, classificação de Strasberg-Bismuth E1. O diâmetro da via lesada é de 3.8 milímetros. A melhor conduta é

- A) reparo primário com anastomose hepaticocoledociana.
- B) reparo primário com anastomose coledocoduodenal.
- C) reparo primário com anastomose coledocojejunal em “Y-de-Roux”.
- D) reparo primário com anastomose hepaticojejunal em “Y-de-Roux”.
- E) ligadura da via biliar principal e reparo tardio após três semanas.

44ª QUESTÃO – Referente à captação de múltiplos órgãos e tecidos para transplante, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O cirurgião responsável pela captação, após a retirada de múltiplos órgãos para transplante, deve emitir o atestado de óbito definitivo do doador.
- B) O tempo de isquemia dos órgãos deve, sempre que possível, ser levado em consideração no agendamento da captação de múltiplos órgãos para transplante.
- C) A solução de preservação de Euro-Collins pode ser utilizada para captação isolada de rins.
- D) A captação das córneas pode ser realizada até mesmo algumas horas após a parada dos batimentos cardíacos.
- E) O aspecto macroscópico dos órgãos, durante o inventário da cavidade abdominal, é o fator mais importante na decisão do uso dos mesmos para transplante.

45ª QUESTÃO – Referente ao transplante hepático inter-vivos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Brasil foi o pioneiro mundial em transplante hepático inter-vivos.
- B) Após a introdução da lista de espera ordenada por gravidade (MELD), houve redução do número de transplantes hepáticos inter-vivos no Brasil.
- C) No transplante hepático pediátrico, o transplante hepático inter-vivos encontra seu maior embasamento, considerando-se a oferta pequena de enxertos pediátricos para transplante.
- D) Parentes de até segundo grau podem ser doadores em vida, de órgãos para transplante.
- E) Nos países asiáticos, o transplante hepático inter-vivos é a principal modalidade de transplante de fígado.

46ª QUESTÃO – A principal causa de morte encefálica dos doadores de fígado para transplante, no estado do Espírito Santo, tem sido, nos últimos cinco anos,

- A) afogamento
- B) traumatismo crânio-encefálico por ferimento de arma de fogo.
- C) traumatismo crânio-encefálico por acidente automobilístico.
- D) acidente vascular cerebral isquêmico.
- E) acidente vascular cerebral hemorrágico.

47ª QUESTÃO – GTD, 18 anos, mulher, portadora de acalasia. Disfagia severa com índice de massa corporal de 25. Qual a melhor conduta a ser realizada nesse caso?

- A) Crurorrafia + funduplicatura à Nissen curto e frouxo.
- B) Cardiomiectomia esofágica sem funduplicatura.
- C) Cardiomiectomia esofágica + funduplicatura à Nissen curto e frouxo.
- D) Cardiomiectomia esofágica + funduplicatura total (360°) longa.
- E) Cardiomiectomia esofágica + funduplicatura parcial anterior.

48ª QUESTÃO – Referente ao período pós-operatório de transplante hepático ortotópico, fígado inteiro, doador falecido, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As fístulas biliares precoces e de alto débito podem ser o primeiro sinal de trombose da artéria hepática.
- B) Os doentes com disfunção renal importante devem receber doses menores de inibidores de calcineurina.
- C) A indução com inibidores de interleucina 2, associada ao uso de corticóides, é o protocolo de imunossupressão mais efetivo. Entretanto, induz maior risco de infecções.
- D) Os receptores com hepatite B devem receber tratamento preemptivo com imunoglobulina humana, mesmo na ausência de qualquer indício de recorrência.
- E) A rejeição celular aguda ao enxerto hepático geralmente é de controle geralmente fácil, sendo o tratamento inicial a pulsoterapia com corticóides.

49ª QUESTÃO – A pancreatite crônica alcoólica (PCA) é uma doença grave, de evolução progressiva, que pode necessitar de tratamento operatório. Assinale a alternativa CORRETA.

- A) A PCA está relacionada ao adenocarcinoma pancreático.
- B) As operações de ressecção pancreática corpo-caudal estão indicadas quando a pancreatite crônica é focal.
- C) As derivações da via biliar principal devem ser realizadas, preferencialmente, com fios de polipropileno 3.0 ou 4.0.
- D) O surgimento de diabetes mellitus é mais comum nas operações de derivação do ducto pancreático principal, que nas ressecções corpo-caudais.
- E) A cirrose hepática quase sempre está associada à PCA.

50ª QUESTÃO – Mulher, 25 anos, vítima de espancamento pelo esposo com socos em região dorsal paravertebral à esquerda da coluna torácica baixa (T10-T11), foi submetida à tomografia computadorizada com observação de lesão em corpo do pâncreas com rotura ductal. Estável hemodinamicamente. A melhor conduta é

- A) pancreatografia endoscópica com colocação de stent ductal.
- B) pancreatorrafia por videocirurgia.
- C) pancreatectomia cefálica com preservação da cauda pancreática.
- D) ressecção de corpo e cauda do pâncreas.
- E) tratamento clínico com antibióticos + nutrição parenteral + octreotida.

51ª QUESTÃO – No tocante às operações de gastroduodenopancreatectomia cefálica para tratamento do carcinoma periampular, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A gastroenteroanastomose deve ser confeccionada na parede posterior do estômago, *oralis totalis*, para melhor esvaziamento.
- B) A linfadenectomia regional é parte importante da operação, contribuindo para o estadiamento adequado da doença.
- C) A reconstrução gástrica a Billroth II com enteroanastomose latero-lateral diminui a ocorrência de síndrome pós-gastrectomia (alça aferente, refluxo alcalino...).
- D) A reconstrução pancreática deve ser realizada preferencialmente em alça jejunal única, na forma ducto-mucosa.
- E) A sobrevida em cinco anos é maior nos colangiocarcinomas distais do que nos adenocarcinomas de cabeça do pâncreas.

52ª QUESTÃO – O carcinoma epidermóide do esôfago médio é neoplasia com letalidade elevada e prognóstico sombrio. A maioria dos doentes chega aos Serviços de Cirurgia do Aparelho Digestivo em estádios avançados da doença. Assinale a alternativa CORRETA no tratamento do carcinoma epidermóide do esôfago médio.

- A) A quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes devem ser indicadas em tumores avançados com suspeita de fístula traqueoesofágica.
- B) A ressecção trans-hiatal (dois campos) é a via de acesso preferível por sua menor morbidade e visibilidade adequada do campo operatório.
- C) A reconstrução deve ser realizada preferencialmente com o estômago, com piloroplastia associada, com anastomose esôfago-gástrica em posição cervical, com sonda nasoentérica transanastomótica, em posição enteral.
- D) Na impossibilidade de reconstrução utilizando-se o estômago, dá-se preferência ao uso do cólon direito como substituto do órgão extirpado.
- E) A ocorrência de segunda lesão primária é rara nos doentes portadores de neoplasia esofágica.

53ª QUESTÃO – Paciente de 30 anos, primigesta, na 21ª semana de gestação é atendida com queixas de sangramento às evacuações. A investigação diagnóstica evidencia a presença de adenocarcinoma do sigmóide, não-obstrutivo. Nesta situação, qual a melhor conduta a ser realizada?

- A) Indução da maturidade fetal com corticóides com retirada do feto por cesariana e posteriormente ressecção do sigmóide.
- B) Indução da maturidade fetal com corticóides realizando a ressecção colônica e o parto cesariano no mesmo tempo cirúrgico.
- C) Ressecção colônica padrão para tratamento desse tipo de neoplasia, com manutenção da gestação.
- D) Transversostomia em alça para profilaxia da obstrução intestinal, aguardar parto cesariano com feto a termo e, após três meses, realizar a resseção colônica.
- E) Transversostomia em alça para profilaxia da obstrução intestinal, aguardar parto cesariano com feto a termo e, simultaneamente, realizar a resseção colônica.

54ª QUESTÃO – O uso de grampeadores para a realização de anastomoses e suturas mecânicas tem sido cada vez mais empregados em cirurgia do aparelho digestivo, como cirurgias bariátricas e oncológicas. O uso adequado desse instrumento é fundamental para otimização dos resultados operatórios. Assinale a alternativa INCORRETA, referente ao uso desse instrumento.

- A) Grampeadores com três linhas de grampos não necessitam de sobressutura.
- B) Grampeadores com duas linhas de grampos requerem sobressutura sistemática.
- C) Devemos utilizar carga branca para tecidos pouco espessos.
- D) No estômago, a carga azul é a mais utilizada por ter o fechamento intermediário entre a branca e a verde.
- E) No reto espesso, a carga verde é a mais apropriada.

55ª QUESTÃO – Atualmente, diversos hormônios têm atuação conhecida na modulação neuroendócrina do trato digestório. Outros hormônios são produzidos no trato digestório e têm efeitos sistêmicos. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os hormônios digestivos.

- A) A secretina atua aumentando a secreção pancreática de água e bicarbonato.
- B) A gastrina aumenta a secreção ácida do estômago e diminui a motilidade gástrica.
- C) O enteroglucagon aumenta a liberação de insulina.
- D) O polipeptídio intestinal vasoativo (VIP) aumenta a secreção pancreática e intestinal.
- E) O glucagon diminui a pressão no esfíncter de Oddi e diminui a motilidade intestinal.

56ª QUESTÃO – Na hepatectomia direita padrão, os segmentos hepáticos ressecados são:

- A) II, III e IV.
- B) II, III, IV e V.
- C) V, VI e VIII.
- D) V, VI, VII e VIII.
- E) V, VI, VII, VIII e I.

57ª QUESTÃO – No reparo de lesões iatrogênicas das vias biliares, por meio de anastomose bílio-entérica em “Y-de-Roux”, o fio mais adequado é

- A) Polidioxanona.
- B) Polipropileno.
- C) Poliglactina.
- D) Poliéster.
- E) Categute.

58ª QUESTÃO – WTD, 14 anos, no oitavo dia pós-operatório de transplante hepático ortotópico devido à insuficiência hepática terminal devido à deficiência de alfa-1 antitripsina, inicia quadro febril com elevação das enzimas de pólo canalicular e hepatocitárias. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à conduta e propedêutica a ser adotada.

- A) Devemos escalonar o uso de antibióticos de modo empírico, em caráter imediato. Coletar amostras para culturas e desescalonar conforme ocorra identificação do agente microbiano.
- B) Se houver a presença de diarreia e lesões aftóides em mucosa, deve ser realizada a pesquisa de infecção por citomegalovírus.
- C) O ajuste da imunossupressão deve ser preferencialmente com uso de micofenolato mofetil para diminuir a probabilidade de evolução para sepse.
- D) Devemos realizar exame de ultrassonografia abdominal com Doppler para avaliar coleções cavitárias, escapes e fluxo nos vasos hepáticos.
- E) Em caso de reoperação ou politransusão, deve ser aventada a hipótese de infecção fúngica.

59ª QUESTÃO – TRD, 82 anos, submetida à colecistectomia por vídeo, após quadro de pancreatite aguda. Durante o ato operatório, foi realizada colangiografia com a constatação de diversas falhas de enchimento em colédoco distal e médio, compatível com cálculos. A via biliar principal mede 2,8 cm de diâmetro. A melhor conduta para o caso em questão, além da colecistectomia, é

- A) realizar coledocolitotomia + instalação de dreno de Kher.
- B) realizar coledocolitotomia + papiloesfincteroplastia.
- C) realizar coledocolitotomia + derivação bilioentérica coledocoduodenal.
- D) realizar coledocolitotomia + derivação bilioentérica em Y-de-Roux.
- E) deixar dreno transcístico e programar papilotomia endoscópica posterior para clarear a via biliar principal.

60ª QUESTÃO – A instalação do pneumoperitônio é o momento crucial para a realização das operações laparoscópicas. No tocante as repercussões hemodinâmicas e metabólicas relacionadas ao pneumoperitônio, podemos afirmar que:

- A) As lesões intestinais despercebidas são a principal causa de óbito relacionado ao acesso laparoscópico.
- B) A eficácia da punção do hipocôndrio esquerdo para a criação do pneumoperitônio artificial foi inferior à da punção na linha mediana, em ensaios clínicos.
- C) O pneumoperitônio diminui o retorno venoso, motivo pelo qual é mais comum a ocorrência de trombose venosa profunda após operações laparoscópicas, em relação às laparotômicas.
- D) O pneumoperitônio diminui a expansibilidade pulmonar, motivo pelo qual é mais comum a ocorrência de atelectasia pulmonar após operações laparoscópicas, em relação às laparotômicas.
- E) As pressões abdominais entre 15 e 18 mmHg são efetivas na expansão abdominal e distanciamento da parede abdominal das estruturas vasculares. Instaladas de forma transitória, são seguras e com pequena repercussão orgânica.