



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
Edital 044/2011

Cargo: Médico / Área: Pediatria

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará sua desclassificação.

CARGO: MÉDICO-ÁREA PEDIATRIA - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES

1ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém proposição de ordem numérica das frases que se seguem, em consonância com a organização adequada de texto. O título se intitula “A questão da pobreza”.

() As evidências históricas mostram que a cultura humana esteve sempre intimamente ligada, desde os seus primórdios, à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais.

() Mesmo nas sociedades mais homogêneas e simples existiam diferenças de sexo e idade atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres.

() A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a certas vantagens como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade.

() Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual os homens desfrutassem de maneira semelhante os bens e as oportunidades da vida social?

() Parece que não.

() O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade.

“A questão da pobreza”. In: COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2ªed. São Paulo: Moderna, 1997. p. 254.

- A) 3, 6, 4, 5, 2, 1
- B) 2, 1, 3, 6, 4, 5
- C) 1, 2, 4, 5, 6, 3
- D) 4, 5, 1, 2, 3, 6
- E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

2ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém pensamento destoante do texto “A questão da pobreza”, organizado na questão anterior.

A) O processo histórico tem revelado como tendência do ser humano demarcar diferenciação crescente e de complexidade em sua organização social.

B) É nesse sentido que se evidencia, na organização social vigente, que a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e de injustiça com outros.

C) Os diversos grupos sociais, neste cenário de sociedade contemporânea, procuram monopolizar privilégios e possibilidades de acesso à produção de bens e aos mecanismos de distribuição dessa produção.

D) Encontrado o princípio de que todos possuem os mesmos direitos perante a lei, tem sido mais fácil justificar as diferenças sociais e articular ações no sentido de que todos sejam iguais na sociedade de hoje.

E) No curso das sociedades plurais, foram se formando grupos, cada um com suas funções, com seus direitos, deveres, compromissos e obrigações.

3ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de referência entre forma verbal e forma substantiva. Marque-a.

- A) infringência – infringir
- B) delinquência – delinquir
- C) ingerência - ingerir
- D) vigência - vigir
- E) emergência – emergir.

4ª QUESTÃO - Uma das alternativas NÃO contém correspondência entre os termos assinalados. Marque-a

- a) Afora ele, não ouvia ninguém. Fora ele, não ouvia ninguém.
- b) A pouco e pouco, deixou-se convencer. Pouco a pouco, deixou-se convencer.
- c) Cada vez mais, desconfia dos conselhos. De mais a mais, desconfia dos conselhos.
- d) Veza por outra, discute com a família. Por vezes, discute com a família.
- e) Em vez de decidir logo, prefere esperar. Em lugar de decidir logo, prefere esperar.

5ª QUESTÃO - Uma das alternativas completa corretamente a lacuna em “É de uso normativo dizer uma ou outra frase: _____.” Marque-a.

- A) Tenho dificuldade de saber o em que pensar. Sei no que pensar.
- B) Venho aqui hoje para esclarecer dúvidas. Não foi eu que fiz os registros em destaque.
- C) O relógio da praça bateu meio-dia e meia. No relógio da praça, bateu 12h30min.
- D) Não nos vemos faz muitos anos. Não nos vemos devem fazer muitos anos.
- E) Algum de vocês concordam com fazer a tarefa? Quais discordam de cumprir a tarefa?

6ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de forma plural. Marque-a.

- A) abdômen – abdomens ou abdômenes
- B) cânon – cânons ou cânones
- C) espécimen – espécimens ou espécímenes
- D) gérmem – germens ou gérmenes
- E) hífen – hifens ou hífenes.

7ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro e, portanto, NÃO completa corretamente a frase “O servidor público foi hospitalizado com _____.” Marque-a.

- A) fratura do fêmur ou femoral
- B) dor no tórax ou dor torácica
- C) distensão na virilha ou distensão inguinal
- D) corte no supercílio ou superciliar
- E) pressão da artéria ou pressão arterial.

8ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém frase correta. Marque-a.

- A) Os filhos são tais qual o pai.
- B) Que sonhos são mais ruins do que os dos indecisos?
- C) Os bombeiros ficaram alertas com as fortes chuvas.
- D) Durante as núpcias, os cônjuges se comportaram com discreção.
- E) Todas as crianças lactantes precisam tomar vacina contra a paralisia infantil?

9ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém uso de frase INCORRETAMENTE caracterizado. Marque-a.

- A) João foi fazer uma visita a seu amigo e depois saiu com a noiva dele. – uso inadequado de termos que se substituem
- B) Opiniões contraditórias, de forma geral, vão ao encontro dos princípios de umas e de outras. – uso adequado de palavras estreitamente relacionadas
- C) Me empreste o relatório em que estão os dados estatísticos sobre reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. – uso adequado de pronome em situação informal de fala
- D) Foram encontrados dois projetis pelos policiais. Dois projéteis foram localizados pela polícia. – uso adequado de palavras sinônimas
- E) Depois da festa de formatura, familiares, professores e concluintes saíram para tomar um trago na esquina. – uso inadequado de expressão trivial.

10ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro na indicação do valor do conector sublinhado. Marque-a.

- A) Como não há um partido dominante no país, a presidente tem necessidade de promover acordos estratégicos entre os partidos políticos (**causa**).
- B) A presidente não pode evitar a fragmentação da base parlamentar, sem que haja uma aliança política em torno de um programa de governo (**modo**).
- C) Por mais que a presidente tente atender aos interesses da base aliada, a necessidade de ter uma base sólida é testada à exaustão (**concessão**).
- D) O chamado “fogo amigo” assombra a presidente, pois os partidos aliados podem “sabotar” uns aos outros quando uma crise surge (**explicação**).
- E) A base aliada do governo é fisiológica demais, para que a presidente rompa com a prática de trocar votos por cargos e emendas (**consequência**).

(Frases adaptadas de “O perigo que mora ao lado”, A Gazeta, 12 agosto de 2011)

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO - Pedro comprou um fogão, cujo preço à vista é 420 reais, pagando em duas prestações mensais iguais. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e a taxa mensal de juros compostos praticada foi de 10%. O valor, em reais, de cada uma das prestações foi igual a

- A) 236,00
B) 238,00
C) 240,00
D) 242,00
E) 244,00

12ª QUESTÃO - Um recipiente tem 40 litros de limonada, composta de concentrado de limão e água, sendo que a água representa 20% da limonada. Deseja-se substituir certo volume da limonada por igual volume de água, de modo que a nova limonada tenha 30% de água. O volume, em litros, que deve ser substituído é

- A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
E) 5

13ª QUESTÃO - Um casal deseja ter 5 filhos. A probabilidade de que tenham 3 filhos de um sexo e 2 filhos do outro é

- A) 62,5%
B) 65%
C) 67,5%
D) 70%
E) 72,5%

14ª QUESTÃO - Em um condomínio de apartamentos,

- Nenhum praticante de futebol é praticante de voleibol;
- Todo praticante de basquetebol é praticante de futebol;
- Algum praticante de handebol é praticante de basquetebol.

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira.

- A) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol é praticante de handebol.
B) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol não é praticante de handebol.
C) Pode-se garantir que algum praticante de futebol não é praticante de handebol.
D) Pode-se garantir que todo praticante de basquetebol é praticante de voleibol.
E) Pode-se garantir que algum praticante de handebol não é praticante de voleibol.

15ª QUESTÃO - Uma agência de turismo alugou um ônibus de 48 lugares para passageiros. Ela cobrou de cada passageiro 600 reais acrescidos de 20 reais para cada lugar vago. Se o total de passageiros foi no máximo 40 e o total arrecadado de todos os passageiros foi 30340 reais, o total de passageiros foi

- A) 31
- B) 33
- C) 35
- D) 37
- E) 39

16ª QUESTÃO - Em um grupo de pessoas, o total de mulheres é igual a 10% do total de pessoas. A média aritmética das idades das pessoas do grupo é 45. A média aritmética das idades dos homens do grupo é 47. A média aritmética das idades das mulheres do grupo é

- A) 23
- B) 25
- C) 27
- D) 29
- E) 31

17ª QUESTÃO - Um pintor precisava pintar um muro inteiro. Com um ajudante, ambos juntos poderiam fazer a pintura toda em 6 horas. O pintor iniciou a pintura sozinho. Depois de 6 horas, o ajudante juntou-se a ele na pintura e, assim, depois de 10 horas contadas a partir do início da pintura, o muro estava todo pintado. O tempo, em horas, que o pintor levaria para pintar sozinho o muro todo é

- A) 17,5
- B) 18
- C) 18,5
- D) 19
- E) 19,5

18ª QUESTÃO - Um reservatório continha um volume inicial de água às 4 horas de certo dia. A partir desse instante, passou-se a retirar água do reservatório à razão de 3 litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água no reservatório era 20% do volume inicial de água. O horário daquele dia em que o volume de água no reservatório era 5% do volume inicial de água era

- A) 17 horas e 45 minutos
- B) 18 horas e 15 minutos
- C) 18 horas e 45 minutos
- D) 19 horas e 15 minutos
- E) 19 horas e 45 minutos

19ª QUESTÃO - Sejam x_1, x_2, \dots, x_n valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. O desvio de cada um dos valores x_1, x_2, \dots, x_n é a diferença entre o valor e a média aritmética dos valores. O desvio padrão dos valores x_1, x_2, \dots, x_n é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos seus desvios. Se o desvio padrão de x_1, x_2, \dots, x_n é d , com $d \neq 0$, então o desvio padrão dos valores $6x_1 + 7, 6x_2 + 7, \dots, 6x_n + 7$ é igual a

- A) d
- B) $6d - 7$
- C) $6d$
- D) $6d + 7$
- E) $d + 7$

20ª QUESTÃO - Num grupo de pessoas,

- 5 pessoas não são leitoras de nenhum dos jornais A, B e C;
- 25 pessoas são leitoras do jornal A;
- 32 pessoas são leitoras do jornal B;
- 11 pessoas são leitoras do jornal C;
- 4 pessoas são leitoras dos jornais A e B;
- 6 pessoas são leitoras dos jornais A e C;
- 7 pessoas são leitoras dos jornais B e C;
- 3 pessoas são leitoras dos jornais A, B e C.

O total de pessoas no grupo é

- A) 59
- B) 61
- C) 63
- D) 65
- E) 67

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão para as versões em Português.

21ª QUESTÃO – Observe a figura a seguir.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---------|---------|---------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | Aluno | Prova 1 | Prova 2 | Média Parcial | Prova Final | Média Final |
| 2 | Fulano | 6,0 | 8,0 | 7,0 | | 7,0 |
| 3 | Sicrano | 8,0 | | 4,0 | 8,0 | 6,0 |
| 4 | | | | | | |


Na linha 1, o texto é mostrado em duas linhas e na célula selecionada a linha única de texto está mostrada na parte superior da célula. Para se conseguir isto,

- A) não é necessário fazer nada, pois é a configuração padrão.
- B) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova pressionando-se a tecla Enter
- C) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova, pressionando-se simultaneamente as teclas Enter e Ctrl
- D) é necessário selecionar a opção Células do menu Formatar e na janela que surgir, selecionar a aba Alinhamento e então ativar a opção Quebrar Texto Automaticamente e selecionar a opção Superior para o Vertical.
- E) é necessário clicar o botão direito do mouse sobre a célula. No menu que surgir, selecionar a opção Quebrar Texto Automaticamente. Repetir o processo para selecionar a opção Alinhar acima.

22ª QUESTÃO – Na parte inferior da janela do Excel, aparecem as abas que indicam as planilhas, como mostrado abaixo.



Deseja-se mudar o nome de uma planilha como mostrado abaixo.



Analise as ações:

- 1) Clicar duas vezes na aba e então digitar o nome desejado.
- 2) Clicar duas vezes na aba e na janela que surgir, digitar o nome desejado.
- 3) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Renomear no menu que surgir, e então digitar o nome desejado.
- 4) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Propriedades no menu que surgir. Na janela que surgir, digitar o nome desejado no campo Nome.
- 5) Selecionar a opção Renomear planilha... do menu Editar e então digitar o nome desejado.

Qual é a opção CORRETA?

- A) Todas as ações levam à mudança de nome.
- B) Apenas a ação 1 funciona.
- C) Apenas as ações 1 e 3 funcionam.
- D) Apenas as ações 1,3 e 5 funciona.
- E) Nenhuma das ações funciona, pois os nomes são fixos.

23ª QUESTÃO – Em um documento Excel foi criada uma planilha com uma tabela de juros em função do numero de parcelas mensais como mostrado a seguir.

| | A | B |
|---|--------------|--------------|
| 1 | meses | juros |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | 4 |
| 5 | | |

Em outra planilha, deseja-se mostrar os juros a serem cobrados de acordo com o número de parcelas.

| | A | B | C |
|---|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | Valor | Parcelas | Juros |
| 2 | R\$ 1.000,00 | 2 | 0 |
| 3 | R\$ 1.500,00 | 5 | 2 |
| 4 | | | |


Qual fórmula deve ser inserida na célula selecionada (e que pode ser copiada para as células abaixo) para mostrar os juros a serem cobrados?

- A) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;2)
- B) =PROC(B2;Tabela!A\$2:B\$4)
- C) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;1)
- D) =PROCV(B2;Tabela;1)
- E) =PROC(B2; Tabela!A2:B4;1)

24ª QUESTÃO – Em muitos textos, principalmente relativos à Matemática, é necessário o uso repetido de sobrescrito e subscrito. A configuração padrão do Word não tem esses ícones na barra de ferramentas como mostrado abaixo.



Pode-se fazer o Word mostrar ícones para sobrescrito e subscrito nessa barra como mostrado abaixo.



Como fazer com que, esses ícones apareçam, nesta posição, nessa barra de ferramentas?

- Clicar duas vezes sobre a barra de ferramentas e na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- Selecionar a opção Barra de Ferramentas do menu Exibir e selecionar a barra Formatação. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, clicar sobre Reorganizar comandos..., selecionar então a barra de ferramentas Formatação, adicionar os ícones e movê-los para a posição desejada.
- Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito. Depois clicar com o botão direito sobre os ícones e movê-los para a posição desejada.

25ª QUESTÃO – Deseja-se fazer uma planilha Excel que calcule a média parcial e a média final dos alunos de uma turma como mostrado abaixo.

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---------|---------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | Aluno | Prova 1 | Prova 2 | Média Parcial | Prova Final | Média Final |
| 1 | | | | | | |
| 2 | Fulano | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 5,8 |
| 3 | Sicrano | 8,0 | | 4,0 | 8,0 | 6,0 |

Deve ser observado que a ausência de uma nota equivale a uma nota zero. Qual fórmula deve ser usada na célula selecionada?

- =MÉDIA(B2:C2)
- =SOMA(B2:C2)/CONTAR(B2:C2)
- =MÉDIAA(B2:C2)
- =SOMA(B2:C2)/CONTAR.NÚM(B2:C2)
- =SOMA(B2:C2)/COLS(B2:C2)

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

26ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

- I. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
- II. O prazo de validade de concurso público será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- III. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis, após 02 anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) I, II e III são falsas.

27ª QUESTÃO – Não são formas de provimento de cargo público:

- A) transferência e ascensão.
- B) nomeação e promoção.
- C) reversão e readaptação.
- D) reversão e recondução.
- E) reintegração e aproveitamento.

28ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

- I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- II. Reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
- III. Reintegração é o retorno por força de decisão judicial do servidor público ao cargo do qual fora exonerado, ensejando o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) Apenas III é verdadeira.

29ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- B) A gratificação natalina é excluída do teto de remuneração.
- C) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
- D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
- E) O servidor poderá perceber remuneração inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a Lei 8.112/90, dependendo da natureza do cargo ocupado e do regime diário de trabalho.

30ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o processo disciplinar regulado pela Lei nº. 8.112/90.

- A) As reuniões e as audiências das comissões de processo administrativo terão caráter reservado.
- B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
- C) A sindicância é a fase do processo disciplinar que antecede ao julgamento e que compreende a instrução, a defesa e o relatório.
- D) A autoridade competente somente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal.
- E) Transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição serão assegurados, ainda que na condição de denunciado ou indiciado.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES

31ª QUESTÃO - Criança de 03 anos com história de anasarca progressiva há 30 dias procurou a emergência pela piora do edema em perna direita e dor a palpação desta panturrilha, sem eritema. EF: Sobrepeso, pulsos pediosos normais. Afebril. PA no percentil 75-90. O eas mostrou prot+++ , piócito 8p/c, hemácias 10p/c. O hemograma, uréia e creatinina estavam normais.

- A) Trata-se um uma complicação da síndrome nefrítica.
- B) Trata-se de uma complicação da Insuficiência renal crônica.
- C) Trata-se de uma complicação da Síndrome nefrótica.
- D) Trata-se de uma complicação neuromuscular do excesso de peso.
- E) Trata-se de uma miosite viral.

32ª QUESTÃO - Lactente de 05 meses apresenta febre alta há três dias, anorexia, prostração, vômitos pós-alimentares, pouca quantidade e oligúria. Evacuação normal. Peso e altura com escore Z -1. Ao exame físico estava febril no momento, reativo, irritado ao manuseio, com mucosas semi-úmidas, enchimento capilar 2 segundos, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto e frequência respiratória de 36 incursões por minuto. Restante do exame físico normal. O hemograma evidenciava leucócitos de 23.000, com 10% de neutrófilos em bastão e proteína C reativa 60. O EAS mostrava prot+, piócitos incontáveis e hemácias 10p/c.

- A) Inicia-se a conduta com a antibioticoterapia endovenosa de urgência pelo choque séptico.
- B) Hidrata-se o paciente, colhe urocultura e hemocultura antes de iniciar o antibiótico endovenoso.
- C) Inicia-se com a realização da punção lombar seguida da antibioticoterapia endovenosa, pela gravidade do caso.
- D) Pedese uma ultrassonografia de urgência para afastar Litíase Renal.
- E) Inicia-se com terapia de reidratação oral e antibioticoterapia oral.

33ª QUESTÃO - Lactente feminino de dois meses com vômitos desde o nascimento deu entrada na Emergência por piora há três dias, com queda do estado geral, dificuldade de sucção e prostração. Encontrase em aleitamento materno exclusivo e fezes normais. Ao exame físico encontrava-se hipoativa, reativa, mucosas secas, anictérica, corada, acianótica, enchimento capilar 2 segundos. Aparelho Respiratório, Taquipnéia, sem tiragens, FR=50, murmúrio vesicular fisiológico direito e esquerdo, Aparelho cardiovascular FC=148, ritmo cardíaco regular-2Tempo, sem sopros, Abdomen escavado, flácido, indolor, fígado 1 cm do rebordo costal direito e Sistema Nervoso com ausência de sinal meníngeo. Restante normal. Foi realizado fluidoterapia rápida para expansão com melhora da hidratação. Feito Raio X de tórax normal, Ultrassonografia urinária=N e seriografia esôfagogastroduodenal normal. Os exames após estabilização hídrica foram: sódio=130mEq/l, potássio=2,9mEq/l, PH=7,28, Cl=102mEq/l/HCO₃=16mEq/l, glicose=70mg%, Ca=7,8mg%, fósforo, proteína total=4,8g%, albumina=2,8g%, globulina=2,0g% e Ânion GAP= normal. EAS= PH=7,0, glicose+, albumina+.

- A) Trata-se de uma Hiperplasia Congênita de Supra Renal.
- B) Trata-se da Deficiência primária de Vitamina D.
- C) Trata-se de Uropatia Obstrutiva.
- D) Trata-se da Síndrome de Fanconi.
- E) Trata-se de Diabetes Insipidus.

34ª QUESTÃO - Paciente diabético de 06 anos (P=25 kg) deu entrada na Emergência Pediátrica torporoso, prostrado, mucosas secas, taquipneico, taquicárdico, pulso fino, PA normal, enchimento capilar 5 segundos e glicemia=450mg% K=3,5mEq/l. Gasometria arterial: PO₂=80 PCO₂=35 HCO₃=18. O tratamento inicial é:

- A) Soro fisiológico=500 ml em até 20 min., podendo repetir, caso não haja diurese, e insulina regular simples=5U endovenosa.
- B) Bicarbonato de sódio 4,2%=15 ml EV e insulina regular simples=2,5 ml+250 ml de soro fisiológico em 1 hora EV.
- C) Insulina NPH=25U subcutânea e soro fisiológico 500 ml em 24h.
- D) Insulina NPH=12,5U subcutânea e regular simples conforme a glicemia em 4h, mantendo 1600 ml de soro fisiológico em 24h.
- E) Soro fisiológico de manutenção, Insulina regular simples 2,5U e Bicarbonato de sódio 8,4%=10 ml.

35ª QUESTÃO - Recém nascido de 40 dias de vida iniciou há 02 semanas com taquidispnéia progressiva e tosse seca esporádica, sudorese à sucção e dificuldade em ganhar peso. Diurese normal. Ao exame encontrava-se hipoativo, reativo, hipocorado+/4, acianótico, enchimento capilar 5 segundos, hidratado, PA normal para idade, taquidispnéia de 50 incursões respiratória por minuto, taquicardia de 160 batimentos por minuto, ritmo de galope e sopro sistólico parasternal esquerdo e foco mitral, abdomen um pouco distendido, globoso, fígado 03 cm rebordo costal direito e SNervoso com reflexos primitivos adequados. O Ecocardiograma mostrou Comunicação Interventricular com repercussão hemodinâmica. A conduta inicial é:

- A) Oxigenoterapia, Expansão com Soro fisiológico=20ml/kg em até 20 minutos e digoxina=0,01mg/kg/dia dividido de 12/12h
- B) Oxigenoterapia, Furosemda=1mg/kg/dose 6/6h, restrição hídrica na fluidoterapia de manutenção e dobutamina=5microg/kg/min
- C) Oxigenoterapia, fluidoterapia de manutenção basal e digoxina=0,01mg/kg/dose de 6/6h
- D) Oxigenoterapia, propranolol 1mg/kg/dia e terapia de reidratação oral
- E) Oxigenoterapia, terapia de reidratação oral, furosemide=1mg/kg/dose de 12/12h e digoxina 0,01mg/kg/dose de 6/6h.

36ª QUESTÃO - Adolescente de 12 anos, obesa procurou atendimento médico por cefaléia e crise de asma. Foi detectado PA=150/100 mmHg. Feito propedêutica diagnóstica para hipertensão arterial não se evidenciou problemas renais, neurológicos ou outros sistemas.

- A) A condução inicia-se com mudança de hábitos alimentares, de atividade física e acompanhamento ambulatorial trimestral.
- B) Trata-se inicialmente com propranolol 1mg/kg/dia, dietoterapia e atividade física.
- C) Inicia-se com enalapril 0,15mg/kg/dia, dietoterapia e atividade física regular.
- D) Encaminha-se para tratamento em terapia intensiva com nitroprussiato de sódio 0,5 microg/kg/min.
- E) Inicia-se com nifedipina 0,25mg/kg/dia, furosemide 4 mg/kg/dia e atenolol 0,5mg/kg/dia.

37ª QUESTÃO - Criança de um ano com Síndrome de Down foi internada por correção definitiva de cardiopatia congênita acianótica com congestão pulmonar.

- A) Trata-se de Dupla Via de Saída do Ventrículo Direito
- B) Tronco arterioso Comum
- C) Drenagem anômala de veias Pulmonares
- D) Tetralogia de Fallot
- E) Defeito do Septo Atrioventricular forma total

38ª QUESTÃO - Lactente de 02 meses iniciou com obstrução nasal há três dias evoluindo com febre baixa, tosse, sibilância, aumento do tempo expiratório, dificuldade de sucção, agitação, gemência e taquidispnéia progressiva durante a sazonalidade do vírus sincicial respiratório. O tratamento baseado em evidências estatisticamente confirmadas são:

- A) Internação, oxigenoterapia e suporte ventilatório, fluidoterapia endovenosa e corticóide endovenoso
- B) Internação, oxigenoterapia e suporte ventilatório, fluidoterapia endovenosa e inalação com beta 2 agonista
- C) Tratamento ambulatorial com soro de reidratação oral, corticóide vo e nebulização com soro fisiológico
- D) Tratamento ambulatorial com soro de reidratação oral, corticóide oral, beta 2 agonista inalatório
- E) Internação, oxigenoterapia e suporte ventilatório , fluidoterapia endovenosa

39ª QUESTÃO - Lactente de 11 meses foi internado na enfermaria de Pediatria procedente do domicílio com febre, tosse produtiva, anorexia, dispnéia e queda do estado geral. O hemograma evidenciava Leucócitos=15.000 neutrófilos em bastão=10%. O Raio X tórax evidenciou condensação em todo lobo superior direito. A antibioticoterapia inicial preconizada é:

- A) Ampicilina 100mg/kg/dia de 8/68h
- B) Amoxicilina/clavulanato 50mg/kg/dia de 8/8h
- C) Ceftriaxone 100mg/kg/dia de 12/12
- D) Claritromicina 15 mg/kg/dia de 12/12h
- E) Penicilina cristalina 100.000U/kg/dia de 4/4h

40ª QUESTÃO - Criança de 01 ano foi admitida na enfermaria de pediatria com febre há dois dias e toxemia, sendo evidenciado uma pneumonia em lobo inferior direito com derrame pleural moderado/grande e imagens de pneumatoceles. A conduta terapêutica é:

- A) Amoxicilina/clavulanato ou oxacilina/ceftriaxone
- B) Ampicilina ou Penicilina cristalina
- C) Claritromicina ou Eritromicina
- D) Metronidazol/gentamicina ou Clindamicina/amicacina
- E) Cefepime ou meropenem

41ª QUESTÃO - Lactente admitido na enfermaria com 05 meses de vida e desconforto respiratório leve/moderado, broncopneumonia e derrame pleural moderado, seroso, unilateral, cuja toracocentese e exame do líquido pleural evidenciou: proteína 3,5g/100ml, pH<7,1, glicose<40mg/dL, DHL>1000 UI/L, Latex positivos para *Haemophilus influenzae*.

- A) Trata-se de um derrame benigno, em fase exsudativa melhor tratado apenas com antibioticoterapia endovenosa.
- B) Trata-se de um derrame benigno, em fase exsudativa melhor tratado com toracocentese seriadas, de alívio, a cada 48 a 72h e antibioticoterapia endovenosa.
- C) Trata-se de um derrame infectado em evolução para Empiema devendo-se proceder a toracosopia para limpeza e drenagem pela cirurgia torácica videoassistida e antibioticoterapia endovenosa.
- D) Trata-se de um empiema melhor tratado com drenagem torácica aberta e antibioticoterapia endovenosa.
- E) Trata-se de um transudato parapneumônico melhor tratado com toracocentese seriada de alívio a cada 48 a 72horas e antibioticoterapia endovenosa.

42ª QUESTÃO - Criança de 03 anos com peso/idade no desvio padrão - 3, altura/idade no desvio padrão -3, peso/altura - 3 relação Peso/Altura - 3 i Índice de Massa Corpórea (IMC) - 3. Baseado nos últimos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006-2007) e adotados pelo Ministério da Saúde, avalia-se respectivamente:

- A) muito baixo peso, muito baixa estatura, magreza acentuada e magreza acentuada
- B) risco nutricional, baixa estatura, desnutrição aguda e desnutrida grave
- C) vigilância nutricional, normal, desnutrido atual e magreza acentuada
- D) baixo peso para idade, baixa estatura para idade, magreza e magreza
- E) desnutrição grave, baixa estatura, desnutrição grave e magreza.

43ª QUESTÃO - Pediatra de plantão foi chamado para atendimento de uma parada cardiorespiratória em criança com sepse, 05 anos, 20 kg, ECG assistolia, oximetria de pulso não aferível e PA não mensurável.

- A) Iniciar o “CAB” com massagem cardíaca a 100 batimentos por minuto, seguida de ventilação com bolsa/máscara até intubação orotraqueal com tubo número 5, fixo no lábio aproximadamente na posição 15, 10 ventilações por minuto, paralelamente com infusão de soro fisiológico 20 ml/kg em bolus endovenoso ou intra ósseo.
- B) Iniciar o “ABC”, avaliar cada etapa nesta sequência e atuar na resolução dos problemas das vias aéreas, respiração e o cardiovascular respectivamente e fazendo expansão na etapa “C”.
- C) Iniciar com desfibrilação 2 J/kg seguida de ventilação com bolsa/máscara e intubação orotraqueal.
- D) Iniciar com intubação orotraqueal e ventilação, seguida de epinefrina 1:10000 a 0,01mg/kg/dose, depois realizar a massagem cardíaca.
- E) Iniciar com epinefrina 1:10.000 a 0,1ml/kg endovenosa ou intra óssea, e ventilar com bolsa/mascar até intubação.

44ª QUESTÃO - Criança de um ano foi admitida na Internação Pediátrica do HUCAM com história de 20 dias com febre persistente, irritabilidade, artralgia, linfadenomegalia cervical, exantema generalizado, incluindo pé e mão, que evoluíram com descamação nas pontas dos dedos de mãos e pés, enantema oral, fissuras labiais, hiperemia conjuntival, edema de pés e mãos e taquicardia. Restante do exame físico sem anormalidades. Inicialmente foi tratada com penicilina 10 dias, sem melhora. As sorologias para Epstein Barr, Sarampo, Rubéola, Citomegalovirus foram negativas. Não houve alteração no mielograma e a hemocultura também foi negativa. Função renal e hepática normal. Hemograma com leucocitose discreta sem desvios. O próximo exame complementar para sustentar o diagnóstico deste caso deve ser:

- A) tomografia computadorizada de tórax
- B) ecocardiograma Bi Dopple
- C) anti estreptolisina O
- D) piopsia de pele
- E) fator anti nuclear

45ª QUESTÃO - Criança masculina de 08 anos transferida da emergência com febre persistente há 08 semanas, com diagnóstico inicial de Dengue, sem indicação de internação, mas evoluindo com piora da prostração. Com 02 semanas surgiram exantema maculo papular de tronco e membros, sendo pior na febre, mialgia, hepatoesplenomegalia, perda de peso, artralguas somatórias e progressivas em dedos das mãos com rigidez matinal, joelhos e tornozelos. Hemograma com anemia, leucocitose com desvio para esquerda e plaquetas normais. Presença de Iridociclite. Ressonância Magnética das articulações mostrando lesões ósseas erosivas. Ecocardiograma normal. Sorologia de Epstein Barr, Toxoplasmose e Citomegalovirose negativas. Mielograma normal.

- A) Trata-se de Gonococemia.
- B) Trata-se de Doença de Kawasaki.
- C) Trata-se de Artrite Idiopática Juvenil.
- D) Trata-se de Lupus Eritematoso Sistêmico.
- E) Trata-se de Febre Reumática.

46ª QUESTÃO - Lactente de 05 meses em aleitamento artificial com fórmula adequada para idade, Peso, Estatura e IMC (Índice de Massa Corpórea) em Score Z-1, foi internado com história de diarreia há 18 dias, inicialmente com febre baixa por 2 dias, evacuando 6 vezes ao dia, líquida, amarelo esverdeada, com distensão abdominal e dermatite perianal e vômitos pós alimentares 3 vezes/dia.

- A) Trata-se de Giardíase.
- B) Doença Celíaca.
- C) Alergia a leite de vaca.
- D) Deficiência Imunológica.
- E) Intolerância a lactose.

47ª QUESTÃO - Criança de 9 meses vem apresentando há 1 mês episódios de curta duração, caracterizados por virar o rosto, hiperextender a cabeça e manter postura tônica, sem perder a consciência, às vezes chegando a 6 vezes/dia. O hemograma evidenciou anemia. O Eletroencefalograma foi normal. A Tomografia cerebral foi normal. Está medicado com fenobarbital 5 mg/kg/dia há 1 mês, sem melhora. Peso Score Z-2, Estatura Score Z+1, e Índice de Massa Score Z-2. Eliminações normais. Apresentou Icterícia Neonatal Fisiológica e Refluxo Gastroesofágico com tratamento postural. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade e Imunização normais.

- A) Trata-se de Síndrome de West.
- B) Trata-se de Síndrome de Lenox Gastaut.
- C) Trata-se de Síndrome de Sandifer.
- D) Trata-se de Síndrome de Prune Belly.
- E) Trata-se de Síndrome de Kartagener.

48ª QUESTÃO - Criança de 4 anos foi atendida no ambulatório de Pediatria para avaliação de rotina, onde foi observado hepatoesplenomegalia. Relata icterícia neonatal. Fundo de olho= normal. Nega outros sintomas. Foram realizados exames de urgência evidenciando: TGO=110, TGP=100, TAP=60%, Gama glicoril transferase=420UI/l, Fosfatase Alcalina=550UI/L, Proteínas Totais=5mg, Alb=3mg, Bilirrubinas Totais=4mg%, Bilirrubina direta=3,5mg%. Hemograma normal. Ultrassonografia abdominal= hepatomegalia, hipertensão porta, ascite, esplenomegalia. Cartão de vacinas em dia, iniciadas com 7 dias. Mãe não fez pré-natal, parto normal domiciliar, chorou logo ao nascer. O próximo exame será:

- A) Sorologia para vírus de Hepatite A, B, C e D, citomegalovirus e Epstein Barr.
- B) Dosagem de ceruloplasmina.
- C) Dosagem de Alfa 1 antitripsina.
- D) Biopsia hepática.
- E) Anticorpo antimúsculo liso.

49ª QUESTÃO - Qual a orientação para as mães de crianças com fenótipo AS:

- A) Tranquilizá-las pois não há comprovação de complicações.
- B) Deverão receber quimioprofilaxia com penicilina benzatina de 21/21 dias.
- C) É contra indicado participar de esportes.
- D) Informá-la do risco de úlceras de perna.
- E) Informá-la da necessidade de possíveis complicações renais e de exercício.

50ª QUESTÃO - Criança de 8 anos, portadora de anemia falciforme, foi internada por crise de dor em perna direita há 24 horas, com piora progressiva, prostração, febre, dispnéia, tosse discreta e anorexia. EF: Regular, hipoativo, "facies de sofrimento", relatando dor em membro 4/5, hipocorado 4/5, febre baixa, sem rubor ou calor em perna, enchimento capilar 2 segundos e saturação de oxigênio de 89%. A ausculta foi normal. Hb=7,5 L=18500 B=10%. O Raio X de tórax mostrou pequeno infiltrado interstício reticular em base direita. A terapêutica é:

- A) Oxigenoterapia com máscara de alta concentração, morfina e ampicilina
- B) Oxigenoterapia com mascar de alta concentração, morfina e ceftriaxone/claritromicina
- C) Oxigenoterapia com traquéia de O₂, dipirona, cetoprofeno e penicilina cristalina
- D) Oxigenoterapia com traquéia de O₂, codeína oral e cefalotina
- E) Nebulização com oxigênio, dipirona, cetoprofeno e oxacilina

51ª QUESTÃO - Criança de 9 anos iniciou com claudicação e artralgia de joelho direito há 2 dias, que evoluiu com edema, rubor, calor, incapacidade de deambular e febre alta. Nega outros sintomas. É esportista e apresenta prurigo estrófulo com lesões recentes. O hemograma mostrava leucocitose de 23.500, 10% de neutrófilos em bastão, VHS de 60 min=120, PCR=95.

- A) Trata-se Artrite Séptica de joelho devendo ser tratada com oxacilina endovenosa.
- B) Trata-se de Artrite Séptica de joelho devendo ser tratada com artrocentese e drenagem articular se necessária e oxacilina endovenosa.
- C) Trata-se de Febre Reumática devendo ser tratada com Penicilina cristalina endovenosa.
- D) Trata-se de Artrite séptica devendo ser tratada com ceftriaxone endovenoso.
- E) Trata-se de Febre Reumática devendo ser tratada com corticóide endovenoso.

52ª QUESTÃO - Adolescente de 13 anos observou o surgimento de nodulação em região cervical direita há 2 semanas com aumento progressivo, afebril e sem outros sintomas. O exame físico mostrou apenas nodulação cervical pouco dolorosa, 3 cm e pouco móvel, sem sinais flogísticos na região lateral do pescoço. As sorologias virais foram negativas, o hemograma era inespecífico e os raios-X tórax e seios da face foram normais. A biópsia mostrou células de Reed Stenberg.

- A) Trata-se de Adenite inespecífica.
- B) Trata-se de Linfoma de Hodgking.
- C) Trata-se de Linfoma não Hodgking.
- D) Trata-se de Cisto Dermoide.
- E) Trata-se de Adenite Viral.

53ª QUESTÃO - Sobre imunização podemos afirmar:

- A) O palivizunabe é indicado em todos recém nascido prematuros mensalmente até os 02 anos.
- B) A vacina do rotavírus pode ser utilizada em unidades hospitalares nas idades de 02 e 03 meses.
- C) A vacina Sabin não tem contra indicação.
- D) A vacina de BCG só pode ser aplicada em recém-nascidos no alojamento conjunto independente do peso.
- E) A vacina pneumocócica deve ser utilizada em prematuros o mais precoce possível, respeitando a idade cronológica.

54ª QUESTÃO - É correto afirmar no atendimento do escolar que:

- A) Os distúrbios de aprendizagem ocorrem apenas em crianças com famílias desestruturadas.
- B) O aluno-problema é detectado na escola e encaminhado para o neurologista fazer um eletroencefalograma.
- C) As atitudes de "bulling" ocorrem principalmente em deficientes auditivos.
- D) O reforço positivo deve ser incentivado nas crianças com dificuldade escolar.
- E) A disfluência (gagueira) da criança deve ser corrigida através de comentários dos pais tipo "relaxe", "calma" e "pense antes de falar".

55ª QUESTÃO - São indicadores médicos de maus tratos, EXCETO:

- A) Atraso inexplicável entre o acidente e a procura do tratamento médico.
- B) Distúrbios de aprendizagem.
- C) Presença de tratamentos médicos relatados, inadequados para o caso.
- D) História incompatível com as lesões existentes.
- E) Alegação do acidente incompatível com o desenvolvimento da faixa etária.

56ª QUESTÃO - Sabe-se das cefaléias da infância:

- A) São mais comuns em meninos adolescentes.
- B) A cefaléia recorrente e primária ocorre geralmente por tensão ou enxaqueca.
- C) A cefaléia aguda deve alertar para a possibilidade de hipertensão intracraniana.
- D) A intensidade da dor se correlaciona com a gravidade da doença.
- E) A ansiedade antecede a cefaléia por enxaqueca.

57ª QUESTÃO - A causa mais comum de obesidade na infância e adolescente é:

- A) hipotireoidismo
- B) síndrome de Cushing
- C) síndrome de Prader-Willi
- D) obesidade Exógena
- E) síndrome de Sotos

58ª QUESTÃO - Sobre os fundamentos do incentivo ao aleitamento materno infantil podemos ressaltar, EXCETO:

- A) prevenção de infecções pela presença de lisozima e IgA secretora.
- B) crescimento pelos fatores de crescimento neural e epidérmico.
- C) estimulação da resposta imune e promoção do crescimento da mucosa pelos nucleotídeos.
- D) proteção da obesidade pelo fator anti-colesterol.
- E) ações antioxidantes das Vitaminas presentes como A, C e E.

59ª QUESTÃO - Criança de 04 meses iniciou há 24h com crises de choro, queda do estado geral, recusa alimentar e em seguida vômitos e fezes semi líquidas com sangue vivo, mucoide ou gelatinoso. Nega outros sintomas. Ao exame físico o abdomen encontrava-se distendido, tenso e doloroso. Peristalse diminuída. Sem outras anormalidades no exame físico.

- A) Trata-se de Gastroenterite Aguda.
- B) Trata-se de Alergia a proteína do leite de vaca.
- C) Trata-se de Enterocolite necrotizante.
- D) Trata-se de Intusseção Intestinal.
- E) Trata-se de Polipose Intestinal.

60ª QUESTÃO - Lactente de 07 meses foi trazido ao atendimento por febre alta há 03 dias (último pico há 12 horas), que cedia após paracetamol, aceitando parte das dietas e sem outras anormalidades na anamnese. Ao exame físico observou-se exantema micropapular, não pruriginoso em face e tórax, afebril, sem outras anormalidades. O hemograma evidenciou discreta leucocitose com linfocitose.

- A) Trata-se de Exantema Súbito causado por Parvovírus B19.
- B) Trata-se de Exantema Súbito causada por Herpesvírus humano 6.
- C) Trata-se do Eritema Infeccioso causado por Parvovírus B19.
- D) Trata-se do Eritema Infeccioso causado por Herpesvírus humano 6.
- E) Trata-se de Eritema Polimorfo medicamentoso.